

Ad 9 wird schwerlich von irgend Jemand Einspruch gethan werden, desto mehr ad 10, 11 und 12, wo sich gegen die scharfsinnigen Aufstellungen des Neujahrsdenkers ohne Schwierigkeit nachweisen liesse, dass dem Columbus Linné der Entomologie Keiner ebenbürtig ist, auch nicht der *zoölogos* Fabricius, mithin eine Quasi-Gleichstellung von 1766 — 1792 nebst den daraus abgeleiteten Consequenzen mit Recht auf Widerspruch stossen würde. Ad vocem *Ferria* ist einfach zu sagen, dass der Name Latreille's für die gemeinte Sache ziemlich von allen Entomologen adoptirt war (wie er es noch heute ubique terrarum Europae ausser Norddeutschland ist) und dass ein kosmopolitischer Usus ausser seiner tyrannischen Gewalt auch seine gute Seite hat. Was sich ad 12 billig dem ehrenwerthen Nordgermanen opponiren liesse, ist das Bedenken, wie und durch wen ohne unvermeidliche subjective Willkür festzustellen, was eine gute und was eine absolut schlechte Beschreibung ist, da zwischen beiden eine unendliche Menge von Zwischenstufen liegt. Sollte er nicht bei manchen Beschreibungen von Ehrn-Fabricius auf handgreifliche Irrthümer und Nachlässigkeiten gestossen sein, ohne deshalb den Namen von 1792 anfechten zu wollen, wenn dieser auch nur durch künstlichen Indicienbeweis zu halten war? Endlich würde die willkürliche Frist von 1—2 Jahren ad 13 unzweifelhaft noch weit mehr Zänkerei und Unsicherheit sanctioniren als der geringe Uebelstand, dass ein kleiner Unsterblichkeits-Wilddieb einem alten Jäger vor der Nase einen oder ein paar Namen weggeschossen hat. Auf die „paar Lorbeerblätter“ kann es den hochgebornen Mono-Grafen nicht ankommen! Auch ist gegen besagte Wilddieberei bereits von mehreren Entomographen das einfache Schutzverfahren eingeschlagen worden, die Diagnosen in gelesenen Journalen zu publiciren, und sich damit die Priorität für die erst später zu edirende ausführliche Monographie zu salviren.

**Beitrag zur Hemipteren-Fauna Sibiriens
und des Russischen Nord-Amerika**
von Dr. C. Stål in Stockholm.

(Hebet Tafel I.)

Die Coleoptera Sibiriens und des Russischen Nord-Amerika können jetzt als gut bekannt angesehen werden,

wenigstens insofern, dass man sich von dem Character der Fauna dieser Gegenden einen ziemlich wahren Begriff machen kann. Gleiches kann man indessen nicht von den anderen Insektenordnungen rühmen, am wenigsten von den im Allgemeinen bis auf die letzten Zeiten in hohem Grade vernachlässigten Hemipteren. Ich hoffe deswegen, dass dieser Beitrag zur Kenntniss der Hemipteren-Fauna dieser durch die grosse geographische Verbreitung der Arten interessanten Länder nicht unwillkommen sein wird.

Der Character der Fauna ist ganz Nord-Europäisch, und es ist wahrscheinlich, dass in unseren Gegenden mehrere der von mir hier neu beschriebenen Arten aufgefunden werden. Merkwürdig ist das Vorkommen bei Irkutsk einer Art der Gattung *Urostylis*, welche zu einer bisher nur im tropischen Asien aufgefundenen kleinen Familie gehört.

Die hier angeführten und beschriebenen Arten sind meistens bei Irkutsk, einige davon in Kamtschatka und auf der Insel Sitka in Nord-Amerika von Herrn Dr. F. W. Sahlberg gesammelt worden und befinden sich alle in meinem Besitze.

Aus derselben Quelle erhielt ich noch 10 oder 12 Arten, meistens kleinere Homopteren, aber in sehr schlechten Exemplaren. Ich wage deswegen nicht, sie zu bestimmen, noch weniger die mir neu scheinenden zu beschreiben.

1. *Picromerus fusco-annulatus*. Stål. Testaceo-flavescens, fusco-aeneo-punctatus; capite fere toto callis anticis thoracis connexivoque aeneis, hoc flavo-maculato; antennarum articulis 3, 4 et 5 apice fuscis. ♀. Long. 11½ Lat. 6¾ Millim.

Irkutsk Sibiriae.

Picromero bidenti et annulicorni valde similis, medius quasi inter ambos; cum illo colore et statura corporis magis convenit, sed spinis thoracis postice haud emarginatis, antennis fusco-annulatis, capite minus parallelo, apice minus late truncato certissime differt. Testaceo-flavescens supra cum pectore fusco-aeneo-punctatus. Caput apicem versus sensim paullulum angustatum, apice truncatum, angulis rotundatis, basi excepta fere totum aeneum. Antennae flavo-testaceae, articulo 3 apice fusciscente, dimidio apicali articulorum 2 apicalium fusco. Thorax pone medium utrimque spina admodum valida acuta integra armatus, marginibus antico-lateralibus serrulatis, tenuissime flavescens, laevibus, callis 2 lituriformibus anticis aeneis, maculisque 2 pone illas parvis laevibus. Scutellum apice dilutius, basi utrimque callo flavo laevi instructum. Abdomen subtus

punctatum, subrugulosum, macula segmenti penultimi en-
prea, connexivo aeneo, testaceo-flavo-maculato. Tibiae
posticae extus basi ipsa aeneae; articulus apicalis tarsorum
nigricans.

2. *Arma Custos*. F.; Hahn. Wanz. Ins. I. p. 95.
Fig. 52.

Irkutsk.

3. *Sciocoris terreus*. Schrank; Fieber. Rhyngo-
tograph. p. 25. 21.

Irkutsk.

4. *Eysarcoris Sahlbergi*. Stal. Ovalis, dilute testaceo-
flavescens, fusco-punctatus, capite rudius et densius fusco-
aeneo-punctato, triangulari, convexiusculo, lobis lateralibus
medio longioribus, ante hunc distantibus (an semper?); an-
tennis nigro-fuscis, articulis 1 et 2 testaceo-flavis; maculis
parvis marginalibus ventris connexivoque nigris, hoc maculis
marginalibus elongatis flavis ornato. ♂. Long. 6, Lat.
4 Millim.

Irkutsk.

Aeliae inflexae primo intuitu similis. Ovalis testa-
ceo-flavescens. Caput triangulare, convexiusculum, ante me-
dium nonnihil magis angustatum, dense et rude fusco-aeneo-
punctatum, linea media laeviuscula pallida; lobis lateralibus
medio longioribus, distantibus. Antennae nigro-fuscae, ar-
ticulis 1 et 2 testaceo-flavis. Thorax angulis lateralibus
vix prominentibus marginibus antico-lateralibus anguste di-
lutioribus, laevibus, callis anticis irregularibus, dilute brun-
nescentibus. Scutellum latitudine basali paullulum longius,
puncto utrimque basali limboque apicali anguste pallidis,
laevibus. Membrana sordide hyalina. Abdomen subtus
maculis parvis marginalibus in incisuris singuli segmenti
connexivoque nigris, hoc in margine ipso maculis elongatis
flavis, longitudinem fere totam singuli segmenti occupanti-
bus, ornato. Pedes dilute flavo-testacei, femoribus subtus
parce fusco-punctulatis, ibidem apice obsolete fuscis; arti-
culus apicalis tarsorum fuscus.

5. *Pentatoma nigricorne*. F.; Hahn. Wanz. Ins. II.
p. 58. Fig. 147 et 148.

Irkutsk.

6. *Pentatoma Lynx*. F.; Gorski. Analecta I. p. 90. 51.
Irkutsk.

7. *Strachia picturata*. Stål. Subobovata, supra viridi-aenea, subtus cum pedibus flavo-albida; maculis pluribus pectoris, seriebus 4 macularum ventris, femoribus apice utrimque, tibiis basi et apicem versus tarsisque aeneis; maculis 2 capitis ante medium, vittis lateralibus scutelli pone medium coëuntibus, apicem attingentibus et ante apicem utrimque sinuatis, margine costali maculaque subtransversa corii ad apicem scutelli thoraceque flavo-albidis, hic illic luteo-indutis, hoc anterieus maculis 2, medio maculis 4 magnis, subtransversis, valde approximatis, aeneis membranaque fusca, albido-limbata. ♀. Long. 8, Lat. $4\frac{1}{2}$ Millim.

Irkutsk.

St. pictae valde affinis, ejus forte varietas. Maculis thoracis majoribus subconfluentibus, corio margine costali medio haud aeneo-maculato, anguloque apicali omnino aeneo differre videtur. Exempla 2 lustravi.

8. *Acanthosoma haemorrhoidale*. L.; Hahn. Wanz. Ins. II. p. 71. fig. 158; Dallas List of Hem. I. p. 303. 1.

Irkutsk.

9. *Acanthosoma dentatum*. De Geer; Dallas List of Hem. I. p. 305. 6.

Irkutsk.

10. *Urostylis flavo-annulata*. Stål. Oefvers. af Kongl. Vet. Ac. Förh. 1854. p. 233.

Irkutsk.

11. *Alydus calcaratus*. L.; Hahn. Wanz. Ins. I. p. 198. fig. 101.

Irkutsk.

12. *Alydus ornaticeps*. Stål. Supra dilute flavo-subtus cum capite pedibusque rufescenti-testaceus; capite nigro-vario, antennarum articulo apicali, pectorisque disco nigro-fuscis; thoracis angulis posticis dilatato-productis, subreflexis, acutis. ♂ ♀. Long. 13—15, Lat. $4\frac{1}{4}$ — $4\frac{1}{2}$ Millim.

Irkutsk.

Supra testaceo-albidus, subtus cum pedibus pallide rufescente-testaceus praesertim abdomine basin versus aeneo-irrorato. Caput obscure aeneum, cruce media, lobo medio, linea lorum lateralium vittaque utrimque inferiore basi dichotoma rufescente-testaceis. Antennarum articulus apicalis crassiusculus, (basi apiceque ipsis exceptis) nigro-fuscus. Thorax angulis posticis dilatato-productis, acutiusculus,

subsursum flexis. Hemelytra parce fusco-punctata, costa maculaque costali parva pone medium pallidis; membrana subsordide hyalina, fuscescente-venosa. Pectus disco obscure aeneum, macula parva rufo-testacea. Pedes parce, femoribus posticis tamen densius, aeneo-punctati, tibiis posticis rectis, tarsorum apicibus fuscis; femoribus posticis subincrassatis, subtus spinis 4 vel 5, quarum 3 majoribus, armatis.

13. *Chorosoma macilentum*. Stål. Stramineum; antennis apicem versus sensim gracilioribus, articulo basali thorace nonnihil longiore, secundo capite cum thorace nonnihil brevior, tertio thorace dimidio longiore, quarto thorace nonnihil brevior, praecedente vix crassior; capite thorace fere longiore, hoc basin versus paululum latiore, latitudine postica tertia parte longiore; hemelytris dilute rufescente-venosis, dimidium abdominis tegentibus, hoc supra nigro-bivittato; tibiis posticis apice intus nigro-fuscis. ♀. Long. 18, Lat. 1 $\frac{3}{4}$, Millim.

Irkutsk.

Chorosomati Schillingi valde affine et simile, cum illo facillime confundendum, distinctum tamen; semper majus, praesertim longius, vix tamen latius; antennarum articulo apicali gracilior, praecedente haud vel vix crassior, thorace longiore, posteriora versus angustior.

14. *Coreus disciger*. Kolenati. *Palaethrocoris* id. Kolenati. Meletemata Ent. II. p. 49. Tab. VII. fig. 4.

Irkutsk.

15. *Dasycoris pilicornis*. Burm.; *Coreus* id. Gorski. Analecta I. p. 146. 93.

Irkutsk.

16. *Corizus Hyoscyami*. L.; Hahn. Wanz. Ins. I. p. 18. fig. 10.

Irkutsk.

17. *Nysius Thymi*. Wolff; Schill. Beiträge p. 85. Tab. VII. fig. 9.

Kamtschatka, Sitka.

Varietatem solito minorem, in omnibus obscuriorem, femoribus (basi apiceque ipsis exceptis) nigro fuscis insignem e Sitka Americae borealis possideo.

18. *Nysius Ericae*. Schill. Beitr. p. 86. Tab. VII. fig. 10. Irkutsk.

19. *Nysius eximius*. Stål. — Supra rufescente testaceus, thorace capiteque pallidioribus, rude fusco-punctatis subtus ex parte cum antennis, vittis 2 capitis punctisque pedum nigricans; hemelytris fusco-variis; membrana hyalina, fusco-irrorata. ♂. Long. 6½, Lat. 2½ Millim.

Irkutsk.

Statura N. Thymi sed multo major, colore picturaque omnium partium valde insignis species. Caput thoraxque pallide rufescente-testacea, rude nigro-fusco-punctata, vittis lateralibus illius, hujus impressione lineari transversa antica antennisque nigris. Scutellum nigro-fuscum. Hemelytra basi subparallela, dein utrimque leviter rotundata, rufescente-testacea, maculis liturisque minutis nigris variegata; membrana pellucida, medio longitrorsum fusco-irrorata. Pectus pallide testaceum, maculis 3 maximis nigris utrimque ornatum, angulo apicali exteriori et ad coxas albidum. Venter nigricans, angulis apicalibus segmenti singuli segmentisque posticis medio rufo-albidis, his ibidem utrimque serie macularum minutarum fuscicarum; foeminae segmenta ventralia 4 et 5 medio usque ad apicem segmenti tertii retractis. Pedes pallide flavi, praesertim femoribus nigro-irrorati.

20. *Rhyparochromus Pini*. L.; Hahn. Wanz. Ins. I. p. 38, fig. 25.

Irkutsk.

21. *Rhyparochromus agrestis*. Fall; Hahn. Wanz. Ins. I, p. 25, fig. 15.

Kamtschatka.

Var. pedibus (apice femorum posticorum, tibiis tarsisque posticis exceptis), articulo basali antennarum rostroque testaceo-flavis; hemelytris absque maculis fuscis. ♂.

Irkutsk.

22. *Rhyparochromus nebulosus*. Fall. Hem. Suec. p. 54. 11.

Irkutsk.

23. *Rhyparochromus convivus*. Stål. — Oblongus, nigricans, opacus; antennis art. 2 et 3 lutescentibus, basi apiceque fuscis; thorace transverso, marginibus lateralibus tenuissime et posterius sordide albidis, hic plus minus dense fusco-punctato; scutello pone medium vittis 2 intramarginalibus lutescentibus; hemelytris sordide albidis, fusco-punctatis, angulo apicali maculisque 3 vel 4 minutis mediis in serie obliqua cum margine apicali parallela positis fuscis; membrana fu-

seescente, albido-venosa, albido-irrorata; pectore ad coxas et margine postico pedibusque sordide flavescens, femoribus (basi apiceque exceptis) nigropiceis, anticis nonnihil in crassatis, subtus spinis pluribus minutis et una majore armatis. ♂. ♀. Long. $4\frac{1}{2}$, Lat. $1\frac{2}{3}$ Millim.

Irkutsk.

R. nebuloso quam simillimus et valde affinis, minor, thorace brevior, utrinque anguste flavido-marginato, scutello apice distincte luteovittato, vittis apice coeuntibus, hemelytris absque macula irregulari majore praesertim differt.

24. *Rhyparochromus staphyliniformis*. Schill. Hahn. Wanz. Ins. I. p. 61, fig. 37 et I. p. 226, fig. 118.

Irkutsk (Larva vel Pupa).

25. *Rhyparochromus silvestris*. Fall. Hem. Suec. p. 61. 22.

Irkutsk.

26. *Oxycaraenus viduus*. Stal — Fusco-ferrugineus vel testaceus, dense profunde punctatus, capite antennis ventraeque nigricantibus; thorace latitudine brevior, anterieus obscuriore; hemelytris subdilute fusco-testaceis, membrana magna, fusca; femoribus fusco-piceis, tibiis tarsisque flavo-testaceis. ♂. Long. 4, Lat. $1\frac{2}{3}$ Millim.

Thorax capite acquilongus, latitudine sua basali tertia parte brevior, medio levissime constrictus. Membrana basi cellulis 2 vel unica, (singuli hemelytri in exemplo unico dissimilis). Tubercula antennifera subproducta. Apparatus odoriferi auriculati, flavi.

27. *Geocoris grylloides*. L.; Hahn. Wanz. Ins. I. p. 86. 48.

Irkutsk.

28. *Geocoris Ulrichi*. Fieber. Entom. Monogr. p. 122. 16. Tab. X. fig. 6.

Irkutsk.

29. *Geocoris albipennis*. Fabr.; Fall. Hem. Suec. p. 70. 2. (vix idem Fieber?)

Irkutsk.

30. *Cymus Resedae*. Panz.; Schill. Beiträge p. 89. Tab. VIII. fig. 5.

Irkutsk.

31. *Anthocoris Nemorum*. L.; *A. silvestris* Hahn.
Wanz. Ins. I. p. 105. fig. 56.

Kamtschatka.

32. *Anthocoris lucorum*. Fall. Hem. Suec. p. 66. 3.

33. *Pyrhocoris fusco-punctatus*. Stål. — Oblongovatus, nigricans, geniculis, tibiis, tarsis, maculis ad coxas marginibusque apicali et laterali anteriore pectoris, hemelytris thoraceque sordide testaceo-flavis, his fuscopunctatis, hoc anterius nigricante; scutello nigricante, linea media maculaque utrimque basali flavo-testaceis; hemelytris abdomine multo brevioribus, membrana incompleta, fusca, reticulatovenosa. ♂. Long. $6\frac{3}{4}$, Lat. 3 Millim.

Irkutsk.

P. aptero statura similis, minor.

34. *Miris erraticus*. L.; Hahn. Wanz. Ins. II. p. 78.
fig. 163 et 164.

Irkutsk.

35. *Miris holsatus*. F.; Hahn. Wanz. Ins. III. p.
41. fig. 256.

Kamtschatka.

36. *Miris virens*. L.; H. Sch. Wanz. Ins. III. p.
42. fig. 257.

37. *Miris ruficornis*. Fall.; H. Sch. Wanz. Ins. III.
p. 40.

38. *Lopus gothicus*. L.; Hahn. Wanz. Ins. I. p. 12.
fig. 15.

Irkutsk.

39. *Cyllecoris equestris*. Stål. — Elongatus, nigricans, antennis rufo testaceis, art. 2. basi et apice, 3 et 4 totis fuscis; vertice usque ad antennis, thoraceque leviter constricto anterius rufo-luteis, vitta hujus pone medium flavo-albida; hemelytris albido-testaceis, appendice corioque extus pone medium obscurioribus, illius parte dimidia basali scutelloque flavo-albidis, hoc basi medio lutescente; membrana subsordide hyalina, testaceo-venosa; abdomine fusco-testaceo, obsolete flavido-fasciato, margine dilutiore, ano obscuriore; pedibus subtestaceo-flavescentibus. ♀. Long. $5\frac{1}{2}$. Lat. $1\frac{2}{5}$ Millim.

Irkutsk.

C. histrionici statura e tei affinis, non nihil minor, colore picturaque supra indicatis distincta pulcherrima species.

Diplacus Stål. Nov. Gen.

Corpus subelongatum, parallelum. Caput supra visum breve, transversum, anterius perpendiculari-declivum, ab antico visum subelongato-obtriangulare. Oculi prominentes, globosi, subparvi. Antennae longae, setacae (art. 2 apicales desunt). Thorax postice capite nonnihil latior, mox ante basin subito valde constrictus, dein antorsum subparallelus, apice ipso utrimque rotundatus. Hemelytra parallela, clavo distincto, appendice nulla vel cum corio omnino confuso; membrana absque cellulis, sed basi lineâ (an venâ verâ?) cum margine corii apicali subparallelâ, apice biundulatâ instructa. Pedes longiusculi, graciles, tibiis parce spinulosis.

40. *Diplacus albo-ornatus*. Stål. Nigricans nitidus; antennis (basi ipsa excepta) flavo-testaceis; pedibus fusco-testaceis, tibiis dilutioribus, extus flavo-testaceis; corio medio fascia lata albida ornato; membrana fuscescente. ♂ (?) Long. $4\frac{1}{2}$, Lat. $1\frac{1}{2}$ Millim. Tab. I. fig. 3.

Irkutsk.

41. *Deraeocoris contaminatus*. Fall.; Kirschbaum. Rhynchoten der Geg. von Wiesbaden. p. 65. 66.

Irkutsk.

42. *Deraeocoris pabulinus*. L.; Kirschb. Rhynchoten. p. 57. 52.

Irkutsk

43. *Deraeocoris Chenopodii*. Fall.; Kirschb. Rhynchoten. p. 57. 51.

Irkutsk

44. *Deraeocoris annulicornis*. Sahlb Capsus id. Sahlberg. Monogr. Geocor. Fenniae. p. 100. 19.

Irkutsk.

45. *Deraeocoris triannulatus*. Stål. — Oblongus, nigricans, nitidus, parce punctulatus; annulo basali articulorum 3 et 4 et subapicali art. secundi antennarum flavo testaceis; tarsorum art. 2 tibusque (apice excepto) testaccis, posticis obscurioribus, hemelytris fusco-brunneis, appendice macula

media transversa extus dilatata percurrente testaceo-albida; macula pectoris ad coxas posteriores albida; ventre utrimque serie macularum obsoletarum testacearum ornato, maculis basalibus distinctioribus. ♀. Long. 8, Lat. 3 Millim. Irkutsk.

D. *Chenopodii* et *annulicorni* statura omnino similis, colore insigni diversus, antennis etiam nonnihil crassioribus, ut mihi videtur.

46. *Deraeocoris nigro-nasutus*. Stål. Oblongus, pallide virescens, nitidus, punctulatus, albido-pilosus; lobo medio capitis nigro; corio apice fascia fusca in angulum basalem internum appendicis continuata, hoc apice ipso nigro-fusco; tarsis apice fuscis. ♀ Long. 5, Lat. 2 Millim. Irkutsk.

D. *contaminato* similis, brevior; pallide virescens, nitidus, pilosulus. Caput laeve, lobo medio nigro. Antennae art. basali capite ab anteo viso paullulum brevior, secundo illo dupplo longiore, nonnihil graciliore, aequali, basi apiceque obsolete fusciscente. Thorax postice capite dupplo latior, latitudine postica tertia fere parte brevior, punctulatus. Scutellum subtiliter transversim rugulosus. Hemelytra dense punctulata, corio apice fascia fusca, intus supra basin appendicis extensa, hoc apice ipso nigro-fusco; membrana sordide hyalina, venis pallidioribus, margine apicali cellularum circuloque marginali exteriori extus aperto fusciscentibus. Articulus apicalis tarsorum fuscus.

47. *Deraeocoris limbatus*. Fall. Kirschb. Rhynchoten. p. 184. 66. a. Irkutsk.

47. *Deraeocoris illotus*. Stål. Oblongus pallide sordide flavus, breviter pilosulus; antennis fuscis, articulo 2 annulo lato pallidior; thorace admodum dense et profunde punctato, antice callis 2 distinctis laevibus, posterius cupreo-micante et intra marginem obsolete fusco; clavo corioque intus obsolete et dilute fusco-testaceis, membrana sordida. ♀. Long. 6, Lat. 2½ Millim. Irkutsk.

D. *limbato* nonnihil major, profunde punctatus, thoracis lateribus rectis, antennis nonnihil crassioribus. Antennae art. 1 thorace ⅓ brevior, 2 thoracis latitudini po-

sticæ aequilongo, aequali, præcedente paullulum graciliore. Thorax latitudine dimidia postica nonnihil longior, lateribus rectis vel levissime subsinuatis, admodum dense et profunde punctatus, callis anticis laevibus, pone callos utrimque nonnihil impressus; posterius cupreo-micans, et intra marginem obsolete fuscescens. Apex rostri tarsorumque fuscus.

48. *Deraeocoris unifasciatus*. F.; Kirschb. Rhynchot. p. 61. 59.

Irkutsk.

49. *Deraeocoris fulvo-maculatus*. De Geer; Kirschb. Rhynchoten. pag. 49. 36.

Kamtschatka.

50. *Deraeocoris approximatus*. Stål. Elongatus, fusco-testaceus, breviter albido-sericans; thorace nitidulo, punctato, posterius medio dilutiore; hemelytris pedibusque pallidius testaceis; angulo apicali exteriori corii, margine interiore anguloque apicali appendicis obscurius rufescenti-testaceis; membrana dilute fusca, basi et pone appendicem albido maculata. ♀. Long. 5, Lat. $1\frac{1}{2}$ Millim.

Sitka.

D. fulvo-maculato similis, minor, sæpissime dilutior, antennis brevioribus, art. basali graciliore, oculis majoribus, magis approximatis, thorace brevior, lateribus rectis. Antennæ art. basali capite ab antico viso plus $\frac{1}{3}$ brevior aequali, 2 basali fere ter longior, nonnihil graciliore 3 basali $\frac{2}{3}$ longior, 4 basali vix longior. Oculi admodum magni, supra per spatium diametro suæ aequalatum separati. Thorax transversus, latitudine basali $\frac{1}{2}$ brevior, convexiusculus, subtiliter punctulatus, collari flavicante.

51. *Deraeocoris brachialis*. Stål. Magnus, oblongus, pallidi griseo-flavescens, nitidus, supra fusco-punctatus; antennis, pectoris disco abdomineque nigricantibus, hoc apice utrimque flavo-testaceo-maculato; scutello convexo; corio apice medio macula fusciscente; appendice (angulo basali interno excepto) dilute punctato, apice fusco; membrana sordida; tibiis tarsisque fuscis, illis albido-biannulatis ♂. Long. 11, Lat. 5 Millim. Tab. I. Fig. 1.

Irkutsk.

Species Europæis omnibus mihi cognitis major, antennarum art. 1 capite ab antico viso parum longior, 2 illo $2\frac{1}{2}$ longior et paullulum graciliore, apicem versus sensim nonnihil crassior.

52. *Deraeocoris Pastinacae*. Fall. Hem. Suec. p. 94. 35.
Sitka.

53. *Deraeocoris mutans*. Stål. Oblongus, pallide griseo-flavescens, nitidus, admodum dense punctatus; antennarum art. 2 basi apiceque, 3 et 4 totis, rugis anticis thoracis, macula magna triangulari basali scutelli, apice appendicis, annuloque subapicali femorum posticorum fusciscentibus vel obscure fuscis; membrana sordide hyalina. ♂. ♀. Long. $3\frac{1}{5}$, Lat. $1\frac{1}{3}$ Mill.
Irkutsk.

D. flavovario affinis, vix quarta parte minor, thorace posteriora versus nonnihil angustiore, art. basali antennarum subbreuiore. Antennae corpori ipsi fere aequilongae, art. basali latitudini verticis intra oculari vix aequilongo, secundo illo vix duplo longiore, basin versus paullulum graciliore (apud ♀ nonnihil brevior et graciliore quam apud ♂), tertio secundi dimidio nonnihil longiore, quarto basali vix aequilongo. Thorax longitudine vix duplo latior, antice quam postice dimidio angustior, utrimque rectus, admodum dense punctatus. Scutellum basin versus subtiliter transversim punctato-rugulosum.

Var. lobo medio capitis, thorace posterius vel fere toto (linea antica lateribusque anterieus exceptis), margine apicali vel fascia lata apicali corii et tunc etiam clavo plus minus obscure fuscis.

54. *Deraeocoris campestris*. L.; Kirschb. Rhyngnoten. p. 65. 67.
Irkutsk, Kamtschatka.

55. *Deraeocoris pratensis*. L.; Kirschb. Rhyngnoten. p. 64. 64.
Irkutsk.

56. *Deraeocoris rubicundus*. Fall.; Kirschb. Rhyngnoten. p. 68. 72.
Irkutsk.

57. *Deraeocoris simulans*. Stål. Ovalis, nigricans vel nigro-fuscus, nitidus, admodum dense punctatus, fusco-albido-sericans; rostro tibiis tarsisque flavo-testaceis; membrana fusca; antennarum art. 2 apicem versus sensim nonnihil incrassato. ♂. Long. $5\frac{1}{3}$ — $6\frac{1}{2}$, Lat. $2\frac{1}{3}$ — $2\frac{2}{3}$ Millim.
Irkutsk, Kamtschatka.

D. atro L. similis et affinis, thorace paullulum subtilius et densius et magis ruguloso-punctato, art. antennarum secundo apicem versus certe incrassato, sed magis sensim et minus quam in illo.

Var. femoribus flavotestaceis, anticis (apice ipso excepto) nigro-fuscis.

In exemplo unico caput et appendix fusco-testacea.

58. *Deraeocoris Dalmani*. Fall.; Kirschb. Rhyngoten. p. 63. 62.

Irkutsk.

59. *Deraeocoris Gyllenhalii*. Fall.; Kirschb. Rhyngoten. p. 69. 75.

Irkutsk.

60. *Leptomerocoris nassatus*. Fall.; Kirschb. Rhyngot. p. 78. 98.

Irkutsk.

61. *Leptomerocoris prolixus*. Stål. Subelongatus, fusco-virescens, fusco-pilosus; capite thorace nonnihil longiore; antennis, tibiis, tarsis maculisque 3 thoracis irregularibus nigro-fuscis. ♀. Long. 6, Lat. $1\frac{1}{2}$ Millim.

Irkutsk.

Capso solitario Meyer affinis, obscurior, capite longiore, thorace brevior, utrimque nonnihil sinuato. Caput elongato-triangulari, latitudine intraoculari vix duplo longius. Thorax latitudine basali $\frac{1}{3}$ brevior, utrimque nonnihil sinuatus, antice quam postice dimidio angustior, nonnihil ante medium callis 2 transversis instructus. Antennae art. basali capite $\frac{1}{2}$ brevior, secundo illo ter longiore, et apice acquirasso, basin versus nonnihil graciliore. Membrana dilute fuscescente, pallidius venosa.

62. *Leptomerocoris leucocephalus*. L.; Kirschb. Rhyngoten. p. 86. 114.

Irkutsk.

63. *Leptomerocoris gilvipes*. Stål. Ovatus, nigricans, parce breviter griseo-sericans; hemelytris abbreviatis, membrana nulla, flavo-griseis; rostro pedibusque dilute testaceo-flavis. ♀. Long. $2\frac{1}{4}$, Lat. $1\frac{1}{2}$ Millim.

Sitka.

Statura omnino *L. caricis*. ♀. colore hemelytrorum, antennis nonnihil gracilioribus differt. Antennae nigro-fuscae,

art. basali capitis latitudini intra-oculari vix aequilongo, secundus illo plus duplo longiore, graciliore, apicem versus sensim levissime incrassato, tertio vix ad medium albido. Thorax transversus, utrimque rectus, postice quam antice vix dimidio latior, latitudine antica nonnihil brevior. Hemelytra abdominis dimidium tantum tegentia, apice subtruncata, membrana nulla.

64. *Leptomerocoris sericans*. Stål. — Oblongus (♂) vel oblongo-ovata (♀), nigricans, aureo-sericans; margine capitis pone oculos utrimque, marginibus pectoris ad coxas, coxis intus, trochanteribusque pallide sordide flavis; rostro, geniculis tibiisque (apicibus exceptis) dilute fusco-testaceis; membrana fusca. ♂. ♀. Long. ♂ 6, ♀ 5½, Lat. ♂ 2½, ♀ 2¾ Millim.

Sitka.

Statura *L. atri*, antennis setaceis. Antennarum articulus basalis thorace vix aequilongus, 2 illo fere duplo longior, nonnihil gracilior, aequicrassus, 3 basali nonnihil longior. Thorax postice quam antice fere duplo latior, latitudine antica vix longior, lateribus levissime sinuatus. Hemelytra apud ♂ magis parallela, completa, apud ♀ posterius subdilata, appendice brevior, membrana abbreviata, parva.

65. *Leptomerocoris mundulus*. Stål. — Subelongatus, flavo-virescens, obsolete sericans; puncto apicali interiore lineaque exteriori articuli basalis, basi apiceque art. secundi antennarum, sutura clavi, costa tenuissime margineque medio apicali appendicis nigro-fuscis; corii margine apicali anguste lineaque discoidali pone medium longitudinali fusciscentibus; membrana pallide fusca, intus adhuc dilutiore, macula pone appendicem albido-hyalina, medio fascia nigro-fusca ornata. ♂. Long. vix 3, Lat. ¾ Millim.

Irkutsk.

Statura *Capsi alieni*, et in ejus vicinitate locandus. Species parva, sed perpulchra, pictura et praesertim macula membranae albido-hyalina fusco-fasciata mox distincta et recognoscenda.

Anapus Stål, Nov. Gen.

Caput latum, thorace postico parum angustius, supra visum valde breve, anterius perpendiculari-declivum. Oculi globosi, prominentes. Antennae sub oculis insertae et ab his nonnihil remotae. Thorax apice haud callosus-annulatus. Membrana unicellulata. Femora postica compressa, lata, apicem versus nonnihil angustata. Tibiae crassiusculae, parce spinosae.

66. *Anapus Kirschbaumi*. Stål. — Oblongus, nigricans (sericans?), subopacus; capitis margine angusto circa oculos, genis, margine antepectoris ad coxas, maculis ad coxas posteriores pallide sordide flavis; geniculis tibiisque fusco-testaceis, tibiis posterioribus dilutioribus; membrana sordida, hyalina, fusco-venosa. ♂. Long. $3\frac{3}{4}$, Lat. $1\frac{1}{2}$ Millim. — Tab. I. fig. 2.

Irkutsk.

Antennae corpori fere aequilongae, art. basali capitis latitudine intraoculari nonnihil brevior, 2 illo haud duplo longiore, parum graciliore, 3 et 4 aequalibus, basali subaequilongis. Thorax transversus, longitudine fere duplo latior, antice quam postice $\frac{1}{3}$ angustior, lateribus rectis, cum scutello oculo armato subtilissime transversim rugulosus.

67. *Labops Burmeisteri*. Stål. Ovatus, nigricans, opacus, flavido-sericans; linea transversa basali medio interrupta capitis, utrimque arcuata, macula sub oculis, genis, marginibus pectoris ad coxas angustissime annuloque latissimo medio tibiarum sordide flavescens; membrana nulla. ♀. Long. $4\frac{1}{3}$, Lat. 2 Millim.

Kamtschatka.

L. Sahlbergi valde affinis, oculis minus prominentibus et sursum productis, antennarum articulo basali brevior, nonnihil graciliore.

68. *Eurymerocoris ericetorum*. Fall. Kirschb. Rhynchoten. p. 99. 122.

Irkutsk.

69. *Eurymerocoris flaveolus*. Stål. — Subelongatus, dilute flavus, nitidus, laevis; thorace transverso, longitudine dimidio latiore, utrimque subsinuato, margine apicali calloso-elevato, ante apicem callis 2 transversis valde distinctis; membrana dilute fuscescente. ♂. ♀. Long. $4\frac{1}{2}$ — 5, Lat. $1\frac{2}{3}$ Millim.

Irkutsk.

Antennae corpore ipso nonnihil longiores, art. basali capite ab antico viso nonnihil brevior, 2 praecedente ter fere longiore, aequicrasso, graciliore, apud ♂ quam apud ♀ nonnihil crassior, 3 illo $\frac{1}{4}$ brevior, apicali basali paululum longiore. Caput supra visum latitudine intraoculari subaequilongum. Thorax capite longior, longitudine sua dimidio latior, postice quam antice vix duplo latior, utrimque nonnihil sinuatus, apice calloso elevatus, pone apicem

callis 2 transversis distinctis, pone callos subimpressus. Membrana leviter infuscata. Tarsi apice fusci.

70. *Eurymerocoris quadrimaculatus*. Fall. Hem. Suec. p. 119. 7.

Irkutsk.

71. *Eurymerocoris obscuriceps*. Stål. Supra pallide testaceo-flavescens, subtus cum capite nigricans, hujus macula basali pallida; hemelytris pedibusque sordide pallidis. his fusco-irroratis. ♀. Long. $3\frac{1}{4}$, Lat. $1\frac{1}{5}$ Millim.

Irkutsk.

Statura fere *E. furcati*, minor, antennis paullulum brevioribus, articulo basali latitudine capitis intraoculari brevior, nigro-fusco, 2 illo vix ter longiore, dimidio basali nigro, 3 et 4 basali sublongioribus, fusco-flavis. Thorax postice quam antice vix duplo latior, latitudine antica sublongior, utrimque rectus, callis 2 anticis admodum distinctis. Hemelytra sordide pallida, membrana infuscata, pallido venosa. Pectus fusco-testaceum. Abdomen nigricans. Pedes sordide pallidi, femoribus fusco-irroratis, posticis compressis, spinulis tibiaram e punctis fuscis ortis.

72. *Eurymerocoris pulicarius*. Fall.; Kirschb. Rhynchoten. p. 101. 149.

Irkutsk, Kamtschatka.

73. *Zosmenus variabilis*. Fieber. Entom. Monogr. p. 32. Tab. II. fig. 12—16.

Irkutsk.

74. *Zosmenus capitatus*. Wolff; Fieber. Entom. Monogr. p. 34. Tab. II. fig. 18.

Irkutsk.

75. *Tingis spinifrons*. Fall.; Fieber. Entom. Mon. p. 104, Tab. IX. fig. 6—12.

Irkutsk.

76. *Nabis fuminervis*. Dahlbom. Kongl. Vet. Acad. Handl. 1850. p. 224.

Irkutsk.

77. *Harpactor pedestris*. Wolff. Hahn. Wanz. Ins. II. p. 25. fig. 129.

Irkutsk.

78. *Salda littoralis*. L.; H. Sch. Wanz. Ins. VI. p. 41. fig. 599.

Kamtschatka.

79. *Salda sericans*. Stål. — Nigricans, fusco-pilosula; capitis parte antica, lateribus thoracis, hemelytris, margine pectoris antico et ad coxas anteriores, pedibus antennisque sordide flavotestaceis, his apicem versus fusciscentibus; clavi indistincti dimidio basali maculaque utrimque laterali postico thoracis nigro-fuscis. ♂. Long. 5, Lat. $2\frac{2}{3}$ Millim.

Kamtschatka.

Ovalis, statura fere *S. littoralis*, aliter colorata, pilosa, thorace brevior, utrimque haud vel vix rotundato, anterius capite cum oculis acquilato, scutello subaequilatere, basi quadrato-subimpresso, impressione basi minus distincta, hemelytrorum margine inter corium et membranam subinciso.

80. *Salda oblonga*. Stål. — Oblonga, nigra, sericans, apice capitis, macula minuta subapicali clavi, litura marginali posterius furcata ante medium, maculis ad marginem apicalem et una ad marginem costalem subapicali corii pedibusque flavo-testaceis, tibiis obscurioribus, femoribus fusco-irroratis. ♂. Long. 6, Lat. vix 3 Millim.

Irkutsk.

S. ripariae longior, hemelytris extus minus rotundatis, thorace lateribus subrecto, oculis magis separatis, scutello majore, margine hemelytrorum costali pone medium cum commissura subparallela. Membrana infuscata, arcu magno marginem anteriorem sequente dilutiore ornata, venis nigro-fuscis.

81. *Gerris rufoscutellata*. Latr.; H. Sch. Wanz. Ins. IX. p. 69. fig. 924.

Irkutsk.

82. *Delphax fusco-vittata*. Stål. — Dilute fuscotestacea, abdomine fronteque nigricantibus, carinis capitis thoracisque pedibusque pallidis, his fusco-sulcatis; vitta dorsali singuli tegminum fusciscenti; fronte basin et apicem versus subangustata, vertice producto. ♂. Long. cum tegmin. $4\frac{1}{3}$, Lat. 1 Millim. — Pl. fig. 4a et 4b.

Irkutsk.

D. longifronti valde similis et affinis, fronte brevior, basin et apicem versus paululum angustata, haud a medio labrum versus parallela, parte verticis anteculari parte intraoculari brevior, (haud subaequilonga), venis

tegminum gracilioribus, apicalibus omnibus integris (venis let 3 a commissura haud furcatis) abunde distincta, diligenter tamen examinanda. Vertex parte anteoculari parte intraoculari dimidio brevior, sulcis 2 frontis in partem anticam continuatis, ibidem divergentibus, nigris. Frons elongata, latitudine media vix ter longior, basin et apicem versus nonnihil angustata, medio et utrimque carinata, inter carinas nigricans. Thorax vertice vix $\frac{1}{3}$ brevior, cum scutello carinis lateralibus obliquis et una media longitudinali instructus. Tegmina abdomine duplo longiora, subsordide hyalina, fusco-venosa, dorso vitta fuscescente ornata, venis apicalibus 6 omnibus integris, exteriori brevissima, cellulam parvam triangularem terminante. Abdomen nigrum, limbo flavo-maculato.

83. *Delphax hemiptera*. Germ.; Stål. Oefvers. af Kongl. Vet. Acad. Förh. 1854. p. 193. 14.
Sitka.

84. *Delphax dispar*. Fall. Stål. Oefv. af Kongl. Vet. Acad. Förh. 1854. p. 194. 16.
Kamtschatka.

85. *Tettigometra obliqua*. Panz.; Burm. Handb. der Ent. II. p. 147. 2.
Irkutsk.

86. *Acocephalus bifasciatus*. L.; Fall. Hem. Suec. Cic. p. 26. 3.
Irkutsk.

87. *Deltocephalus abdominalis*. L. Fall. Hem. Suec. Cic. p. 31. 10.
Kamtschatka.

88. *Deltocephalus collinus*. Bohem. Kongl. Vet. Acad. Handl. 1849. p. 261. (♂ ♀)
Irkutsk.

89. *Deltocephalus Bohemani*. Zett. Ins. Lappon. p. 290. 7. (♂ ♀)
Irkutsk.

90. *Deltocephalus ocellaris*. Fall.; Hem. Suec. Cic. p. 33. 13.
Kamtschatka.

91. *Deltocephalus striatus*. Fall.; Hem. Succ. Cic. p. 35. 17.

Kamtschatka.

92. *Deltocephalus areatus*. Stål. Dilute griseo-flavesceus; maculis 6 (2. 2. 2.) verticis, capiteque antico nigro-fuscis, lineis transversis frontis maculisque genarum pallidis; thorace anteriori fusco-maculato; tegminibus subalbido-hyalinis, albido-venosis, multi-areolatis, areola singula tenuissime, apicalibus apice tamen nonnihil latius fusco-marginatis; pectore abdomineque nigricantibus. ♂. Long. $3\frac{1}{2}$, Lat. $\frac{1}{3}$ Millim.

Irkutsk.

D. striato valde similis et affinis, capite antico maculisque verticis nigro-fuscis mox distinctus. Caput subobtusè triangulariter productum, supra pallide griseo-flavesceus, maculis 6 (2. 2. 2.) nigro-fuscis, quarum 2 apicalibus valde approximatis; subtus nigro-fuscum, frontis lineis transversis subobsoletis, maculisque genarum, lororum clypei que pallidis. Thorax cum scutello pallide griseo-flavesceus, illius maculis anticis hujus macula basali utrinque fuscis. Tegmina subalbido-hyalina, admodum valide albido-venosa, clavo areolis discoidalibus 6, quarum posteriore media valde elongata, apicalibus 3 a margine interiore extrorsum magnitudine sensim decreescentibus, et una inter areolam apicalem internam et clavum, omnibus areolis tenuissime fusco-marginatis, apicalibus apice tamen latius. Pectus et abdomen nigricantia, hoc tenuissime flavo-cincto. Pedes pallide griseo-flavescentes, femoribus anterioribus ultra medium articulisque tarsorum apice nigro-fuscis, illis ibidem flavo-variis, tibiaram posticarum spinulis e punctis nigro-fuscis ortis.

93. *Thamnotettix notaticeps*. Stål. Dilute griseo-flavesceus, capite pedibusque flavescentibus, maculis 2 verticis apicalibus valde approximatis, maculisque basalibus frontis cum illis utrinque subconfluentibus, hujus etiam marginibus lateralibus sub oculis, maculis anticis thoracis femorumque anteriorum, pectore abdomineque nigricantibus, his 2 flavo-marginatis, hujus margine flavo nigro-maculato. ♀. Long. 4, Lat. $1\frac{1}{4}$ Millim.

Irkutsk.

Statura fere *Th. striolae*, sed brevior. Caput flavesceus, supra visum transversum, obtusissime rotundatum, maculis 2 verticis apicalibus valde approximatis, 2 etiam frontis basalibus nonnihil majoribus distantibus, cum illis utrinque subconfluentibus et quadrangulariter dispositis,

marginibus frontis infraocularibus, limbo lororum tenuissime maculaque clypei nigricantibus. Thorax et scutellum griseo-flavescentia, ambo maculis basalibus nigro-fuscis ornata. Tegmina abdomen nonnihil superantia, pallide subfusco-hyalina, flavido-micantia, subtiliter nonnihil pallidius venosa, sutura clavi fusca; corio areolis discoidalibus valde elongatis, apicalibus 3 (quarum una omnino media), et una inter areolam apicalem internam et clavum. Pectus et abdomen nigra, flavo-cincta, hujus margine flavo, maculis parvis nigris ornato; valvulis flavis, intus nigris. Pedes pallidius flavi, apicibus ipsis articularum tarsorum punctisque minutis ad ortum spinarum tibiaram posticarum nigricantibus.

94. *Thamnotettix fascifrons*. Stål. — Flavescens, lineis transversis maculisque 2 basalibus frontis, saepe ad fasciam confluentibus, litura utrimque angulata marginibusque ad oculos verticis, vittis 2 thoracis, basi scutelli pectore abdomineque nigro-fuscis, hoc flavo-marginato; femoribus ultra medium fuscis; tegminibus fusco-hyalinis, flavido-venosis. ♀. Long. 4, Lat. $1\frac{1}{6}$ Millim.

Sitka.

Variat vittis thoracis latissimis, thoracem fere totum occupantibus.

Staturâ praecedentis, cui affinis. Caput flavescens, breve, obtuse triangulare, verticis margine ad oculos liturisque 2 anticis introrsum acute angulatis (ramulo eorum antico transverso), lineisque transversis frontis saepe ad fasciam confluentibus nigris aut fuscis; maculis genarum et clypei fuscis. Thorax flavescens, vittis 2 approximatis utrimque dilatatis nigro-fuscis. Scutellum nigro-fuscum, marginibus lateralibus apiceque flavescens. Tegmina abdomen nonnihil superantia, fusco-hyalina, flavido-venosa, areolis elongatis. Pectus et abdomen nigricantia, hoc flavo-limbato, incisuris nigris. Pedes pallidius flavescens, femoribus anterioribus ultra medium, tibiis intus, punctis ad ortum spinarum tibiaram posticarum apicibusque articularum tarsorum fuscis.

95. *Thamnotettix sex-notata*. Fall. Hem. Suec. Cic. p. 47. 36.

Sitka. Kamtschatka.

96. *Thamnotettix sordidipennis*. Stål. — Nigricans, macula genarum, vitta clypei, linea transversa basali frontis utrimque ramulum brevem retrorsum emittente, linea longitudinali media margineque angusto postico verticis, vittis

2 approximatis thoracis, angulis basalibus scutelli limboque abdominis flavescens; tegminibus sordidis, hyalinis; pedibus griseo-flavescentibus, fusco-variis. ♂. Long. $2\frac{3}{4}$, Lat. vix 1 Millim.

Irkutsk.

Parva, latiuscula Th. fascifronti staturâ similis. Tegmina subfusco-hyalina, subtiliter venosa, areolis elongatis. Pedes griseo-flavescentes, basi femorum anteriorum apicibusque articularum tarsorum fuscis.

97. *Thamnotettix lineatifrons*. Stål. — Flavo-virescens; capite valde obtuse triangulari, linea transversa subapicali verticis, lineolis fasciâque angusta basali frontis medio interruptis, macula magna antepectoris abdomineque (limbo excepto) nigricantibus; tegminibus sordide hyalinis, flavido-venosis. ♂. Long. $4\frac{1}{2}$, Lat. $1\frac{1}{2}$ Millim.

Sitka.

In vicinitate Th. sex-notati locanda. Flavo-virescens. Caput supra visum breve, obtuse triangulariter productum, flavescens, verticis linea subapicali medio interrupta, frontis lineolis transversis utrimque fasciâque angusta basali utrimque adhuc angustiore, medio subinterrupta, margine basali utrimque lituraque minuta media clypei nigricantibus aut fuscis. Thorax transversim rugulosus, arcu antico obsoleto fuscescente. Linea transversa discoidalis scutelli nigra. Tegmina abdomen multo superantia, sordide hyalina, flavido-venosa, areolis discoidalibus valde elongatis, apicalibus 3 (interiore maxima), et una inter areolam apicalem anteriorem et clavum. Pectus flavescens, nigro maculatum. Abdomen nigrum, limbo valvulisque flavis. Pedes pallide flavi, punctis ad ortum spinarum tibiarum posticarum, tarsorum omnium apicibus fuscis aut nigro-fuscis.

98. *Athysanus transversus*. Fall. Hem. Suec. Cic. p. 20.

Irkutsk.

99. *Athysanus grisescens*. Zett. Ins. Lappon. p. 295. 13.

Irkutsk.

100. *Athysanus striatulus*. Fall. Hem. Suec. Cic. p. 33

Kamtschatka.

101. *Typhlocyba pura*. Stål. — Dilute subolivaceo-

flava; abdomine pallide virescente, tibiis apicem versus tarsisque prasinis; tegminibus flavescente-hyalinis, basi et apicem versus subdecoloribus, areolis apicalibus 4, secunda (a commissura) parallela, tertia apicem versus latiore. ♂. Long. $3\frac{3}{4}$, Lat. $\frac{3}{4}$ Millim. Tab. I. fig. 5.

Sitka.

Tegmina abdomine duplo fere longiora, apice rotundata, areolis apicalibus elongatis 4, quarum 1 (a commissura) elongato-triangulari basi reliquis latiore, 2 parallela, 3 basi secundâ nonnihil angustiore, apicem versus sensim nonnihil latiore, 4 in medio quam basi nonnihil latiore. Alae dilute lacteae, subvitreae, posterius ab apice limbatae, in parte antica venis 3 parallelis instructae, quarum 2 anticis magis approximatis, pone medium ad unam confluentibus.

102. *Typhlocyba commissuralis*. Stål. — Flavo-albida, capite circa oculos scutelloque pallide brunnescentibus, hujus marginibus lateralibus tenuissime venaque ipsa marginali interna tegminum ultra medium nigricantibus; tegminibus pallidissime flavescantibus, apice subdecoloribus, costa basi fuscescente, areolis apicalibus 4 triangularibus, lateralibus marginem apicalem ipsam haud attingentibus, 2da basi latiuscula, 3tia basi angulum acutum formante. ♂. Long. $4\frac{1}{2}$, Lat. $\frac{3}{4}$ Millim. — Tab. I. fig. 6.

Sitka.

T. lineatellae subsimilis. Tegmina areolis apicalibus 4 instructa, quarum externis apicem haud attingentibus, obtriangularibus, basi latis et ibidem utrimque suboblique truncatis, secunda (a commissura) apice omnium latissima, intus sensim angustata, basi utrimque oblique truncata, tertia triangulari, basi angulum acutum formante.

103. *Typhlocyba carneola*. Stål. Dilute carnea, vertice scutelloque in pallide flavescantem migrantibus; tegminibus apicem versus decoloribus, subcarneo-venosis, abdomine nigro, ano, pedibus, fronte incisurisque ventris tenuissime pallide flavescantibus. ♂. Long. $3\frac{1}{3}$, Lat. $\frac{3}{4}$ Millim. Tab. I. fig. 7.

Sitka.

Tegmina cellulis apicalibus 4 elongatis instructa, intermediis 2 subparallelis, quarum anteriore exteriori paullulum longiore, basi truncatis; marginali antica prope basin nonnihil angustata, postica elongato-triangulari. Alae marginatae, anterieus venis 3 instructae, quarum 2 anticis pone medium ad unam confluentibus, posteriore pone medium furcata.

104. *Bythoscopus Populi*. L.; Fallén. Hem. Suec. Cic. p. 60. 3.
Irkutsk.
105. *Bythoscopus venosus*. Fall. Hem. Suec. Cic. p. 38. 21.
Irkutsk.
106. *Bythoscopus Rubi*. Bohem. Kongl. Vet. Acad. Handl. 1845. p. 55. 27.
Irkutsk.
107. *Euacanthus nigro-flavus*. Stål. — Flavescens, disco fere toto verticis, thorace (angulis lateralibus exceptis), scutello, clavo (commissura excepta) dorsoque abdominis nigriâ; tegminibus abdomine nonnihil brevioribus; unguiculis nigro-fuscis. ♀. Long. 5 $\frac{1}{4}$, Lat. 1 $\frac{1}{2}$ Millim.
Irkutsk.
108. *Tettigonia viridis*. L.; Sign. Annal. Ent. 1854. p. 17. 166. Pl. II. fig. 3.
Irkutsk.
109. *Aphrophora corticea*. Germ.; Bohem. Kongl. Vet. Acad. Handl. 1847. p. 24.
Sitka.
110. *Aphrophora bifasciata*. Fabr.; *Cercopis alni*. Fall. Hem. Suec. Cic. p. 2.
Irkutsk.
111. *Lepyronia coleoptroto*. L.; Am. & Serv. Hem. p. 567. 3.
Irkutsk.

Explicatio tabulae.

1. *Deraeocoris brachialis*. Magnitudo aucta, 1. a. magnitudo nat.
2. *Anapus Kirschbaumi*. Magn. aucta; 2. a. magn. nat. 2. b. Caput a latere visum.

3. *Diplacus albo-ornatus*. Magn. aucta, 3. a. magn. nat.; 3. b. Caput ab antico visum. 3. c. Caput a latere visum.

4. a. Caput *Delphacis fusco-vittatae* ab antico visum. 4. b. ejusdem ala antica.

5. a. et b. alae antica et postica *Typhlocybae purae*.

6. ala antica *Typhl. commissuralis*.

7. a et b. ala antica et postica *Typhl. carneolae*.

Ueber auffallende Nachlässigkeiten.

Von **C. A. Dohrn**.

Im Jahrgange 1857 der Berliner Entomol. Zeitschrift sagt Herr Professor Dr. Schaum bei Gelegenheit seiner Recension des Marseul'schen Catalogue des Coléoptères d'Europe, dass er 1852 die vierte Auflage des Stettiner Katalogs geliefert habe und fährt fort: „Diese Auflage, welche von mir nach bestimmten Principien in einheitlicher Weise durchgeführt, zum ersten Male ein mit Kritik verfasstes, und mehrfacher, besonders durch die Beschleunigung des Druckes veranlasster Lücken ungeachtet, ziemlich vollständiges Verzeichniss der beschriebnen europäischen Käfer lieferte, hat in den folgenden Auflagen zwar manche Zusätze erhalten, es haben die Ergänzungen und Verbesserungen aber nicht mit den neuen Leistungen der descriptiven Entomologie Schritt gehalten*); auch sind mehrere von mir vermiedene Irrthümer in dieselbe aufgenommen worden. — — —“

*) Um nur auf eine besonders auffallende Nachlässigkeit hinzuweisen, ist die Gattung *Bembidium* unverändert aus der vierten Auflage in die folgenden hinübergenommen worden, obwohl die Monographie von *Jacquin Duval*, von der ich nur den Anfang hatte benutzen können, 1853 vollendet worden war. Die Hälfte der Gattung ist daher nach dieser Monographie, die andere Hälfte auch gegenwärtig noch ohne die Benutzung derselben zusammengestellt.